

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRENEES"

(ARIEGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT,
HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Rue St-Jean prolongée -

- 31130 BALMA - (Tél. 24.06.51)

ABONNEMENT ANNUEL

Rég. recettes Dir. Dép. Agri. Hte-Gne

C.C.P. 8612-11 R TOULOUSE

- BULLETIN TECHNIQUE N° 202 -

Edition Grandes Cultures : n° 10

24 novembre 1981

/ CEREALES /

JAUNISSE NANISANTE DE L'ORGE, SUR ORGE ET BLE

Le dernier bulletin du 8 octobre a fait le point sur les symptômes et les dégâts que peut provoquer cette maladie dans les cultures de céréales, et a indiqué que la seule méthode de lutte actuellement connue consistait à traiter contre les pucerons vecteurs.

Nous conseillons aux agriculteurs de visiter dès à présent leurs parcelles de blé et d'orge ayant atteint ou dépassé le stade 2 feuilles pour déceler la présence éventuelle de pucerons.

Le contrôle doit être effectué de la façon suivante :

- Traverser chaque parcelle en diagonale et observer 10 fois 10 plantes à intervalles réguliers.
- Noter à chaque arrêt le nombre de plantes avec pucerons (sans détailler le nombre de pucerons par plante).
- Totaliser le nombre de plantes avec pucerons sur les 100 plantes observées.

Une intervention insecticide est justifiée sur les céréales ayant atteint au moins le stade 2 feuilles dès qu'on observe 30 % de plantes avec pucerons.

A titre indicatif, nous informons les céréaliculteurs que la situation sur 40 parcelles visitées par la Station d'Alertes était la suivante le 20 novembre :

- Seules 2 parcelles d'orge du Tarn-et-Garonne (MONTECH et LA VILLE DIEU DU TEMPLE) avaient atteint le seuil de 30 % de plantes avec pucerons.

- La présence de pucerons au-dessous de ce seuil était notée dans 70 % des parcelles visitées.

- Dans la moitié de ces parcelles, on observait la présence de pucerons ailés indiquant que les infestations provenant de l'extérieur se poursuivaient.

Si le temps doux actuel persiste, il est à prévoir que les populations de pucerons vont continuer à augmenter.

Nous insistons donc sur la nécessité d'une surveillance attentive des blés et orges tant que le froid ne fera pas son apparition.

P...269

Au cas où un traitement serait nécessaire, utiliser un des insecticides du tableau ci-dessous :

MATIERE ACTIVE	SPECIALITE - CONCENTRATION	FIRME	DOSE
bromophos	NEXION EC 40 360 g/l	SOVILO	1 l/ha
	SOVI-NEXION 25 EN 250 g/l	SOVILO	1,5 l/ha
	RHODIANEX 250 g/l	RHODIAGRI	1,5 l/ha
perméthrine	PERTHRINE 250 g/l	SOPRA	0,25 l/ha
	AMBUSH 250 g/l	LA QUINOLEINE	0,25 l/ha
fenvalérate	SUMICIDINE 100 g/l	AGRISHELL	0,25 l/ha
deltaméthrine	DECIS 25 g/l	PROCIDA	0,3 l/ha

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,
 Chef de la Circonscription Phytosanitaire "MIDI-PYRENEES",

J. TOUZEAU.-

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de "MIDI-PYRENEES".

Le Directeur-Gérant : J. TOUZEAU.-

C.P.P.A.P. - N° 532 A.D.